



کلاس ما



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو یاد بگیرید

@davaazdahom kelasema.com



راهنمای حل فصل ۲ فیزیک دوازدهم

رشته ریاضی و فیزیک

منطبق بر کتاب درسی




کلاس ما



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو یاد بگیرید

@davaazdahom kelasema.com



@Schoolphysics

گروه فیزیک استان گیلان

دینامیک و حرکت دایره‌ای				
صفحه pdf	صفحه کتاب درسی	فعالیت / پرسش / قمرین / مسائل		
		۱-۲- قوانین حرکت نیوتون		
۱	۳۱	پرسش ۱-۲	۱	
۱	۳۱	پرسش ۲-۲	۲	
۲-۱	۳۱	فعالیت ۱-۲	۳	
۲	۳۲	پرسش ۳-۲	۴	
۲	۳۲	پرسش ۴-۲	۵	
۲	۳۵	پرسش ۵-۲	۶	
	۳۵	۲-۲ معرفی برخی از نیروهای خاص		
۳	۳۶	تمرین ۱-۲	۷	
۳	۳۷	تمرین ۲-۲	۸	
۳	۳۸	تمرین ۳-۲	۹	
۴-۳	۳۹	پرسش ۶-۲	۱۰	
۴	۴۰	پرسش ۷-۲	۱۱	
۵	۴۱	تمرین ۴-۲	۱۲	
۵	۴۱	آزمایش ۱-۲	۱۳	
۶-۵	۴۲	فعالیت ۲-۲	۱۴	
۶	۴۲	فعالیت ۳-۲	۱۵	
۷-۶	۴۳	تمرین ۵-۲	۱۶	
۷	۴۳	فعالیت ۴-۲	۱۷	
۷	۴۵	تمرین ۶-۲	۱۸	
۸	۵۷	پرسش و مسئله‌ها آخر فصل - ۱	۱۹	
۹-۸	۵۷	پرسش و مسئله‌ها آخر فصل - ۲	۲۰	
۹	۵۷	پرسش و مسئله‌ها آخر فصل - ۳	۲۱	
۱۰	۵۷	پرسش و مسئله‌ها آخر فصل - ۴	۲۲	
۱۱	۵۷	پرسش و مسئله‌ها آخر فصل - ۵	۲۳	
۱۴-۱۳-۱۲-۱۱	۵۷	پرسش و مسئله‌ها آخر فصل - ۶	۲۴	
۱۵	۵۷	پرسش و مسئله‌ها آخر فصل - ۷	۲۵	
۱۶-۱۵	۵۸	پرسش و مسئله‌ها آخر فصل - ۸	۲۶	
۱۷	۵			
۱۸-۱۷	۵			



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو یاد بگیرید

۱۸	۵۸	پرسش و مسئله ها آخر فصل-۱۱	۲۹
۱۹	۵۸	پرسش و مسئله ها آخر فصل-۱۲	۳۰
۲۰	۵۸	پرسش و مسئله ها آخر فصل-۱۳	۳۱
۲۰	۵۸	پرسش و مسئله ها آخر فصل-۱۴	۳۲
۲۰	۵۸	پرسش و مسئله ها آخر فصل-۱۵	۳۳
	۴۶	۳-۲ تکانه و قانون دوم نیوتون	
۲۱	۴۷	تمرین ۷-۲	۳۴
۲۱	۵۹	پرسش و مسئله ها آخر فصل-۱۶	۳۵
۲۱	۵۹	پرسش و مسئله ها آخر فصل-۱۷	۳۶
		۴-۲ حرکت دایره ای یکنواخت	
۲۲	۴۹	پرسش ۸-۲	۳۷
۲۲	۴۹	پرسش ۹-۲	۳۸
۲۲	۵۱	تمرین ۸-۲	۳۹
۲۲	۵۱	پرسش ۱۰-۲	۴۰
۲۳	۵۲	تمرین ۹-۲	۴۱
۲۳	۵۳	تمرین ۱۰-۲	۴۲
۲۳	۵۹	پرسش و مسئله ها آخر فصل-۱۸	۴۳
۲۴	۵۹	پرسش و مسئله ها آخر فصل-۱۹	۴۴
	۵۳	۵-۲ نیروی گرانشی	
۲۶-۲۵	۵۴	فعالیت ۵-۲	۴۵
۲۶	۵۶	تمرین ۱۱-۲	۴۶
۲۷	۵۶	پرسش ۱۱-۲	۴۷
۲۷	۵۶	تمرین ۱۲-۲	۴۸
۲۸-۲۷	۵۶	تمرین ۱۳-۲	۴۹
۲۸	۵۹	پرسش و مسئله ها آخر فصل-۲۰	۵۰
۲۸	۶۰ - ۵۹	پرسش و مسئله ها آخر فصل-۲۱	۵۱
۲۹-۲۸	۶۰	پرسش و مسئله ها آخر فصل-۲۲	۵۲
۲۹	۶۰	پرسش و مسئله ها آخر فصل-۲۳	۵۳
۳۰-۲۹	۶۰		



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو باد بگیرید

@davaazdahom kelasema.com

پرسش ۱-۲

در شکل روپرتو بک کشی در حال حرکت را می‌بینید که نیروهای وارد بر آن متوازن‌اند. کدام نیروها اثر یکدیگر را خنثی کرده‌اند؟



۱

پرسش ۲-۲

در فیلمی علمی - تخیلی، موتور بک کشی فضایی که در فضای تهی خارج از جو زمین و دور از هر سیاره و خورشید در حرکت است، از کار می‌افتد. در نتیجه حرکت کشی فضایی کُند می‌شود و می‌ایستد. آیا امکان وقوع چنین رویدادی وجود دارد؟ توضیح دهید.

۲

فعالیت ۱-۲

درباره آزمایش ذهنی گالیله تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید.



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو یاد بگیرید

@davaazdahom kelasema.com

۳

خیر - بر طبق قانون اول نیوتون، وقتی برآیند نیروهای وارد بر جسم صفر باشد. جسم در حال حرکت با سرعت ثابت، حرکت خود را حفظ می‌کند.

گالیله در سال ۱۵۸۹ دستگاهی ساخت که ثابت می‌کرد که وقتی که دو جسم با اندازه و وزن های مختلف از یک ارتفاع رها می‌شوند، زمان رسیدن هر دو جسم به زمین یکسان است. این گفته با آنچه که انسان‌ها باور داشته‌اند و در آن زمان درس گرفته بودند، مغایرت داشت. ارسطو کسی بود که این نظریه را ارائه داده بود که اجسامی با وزن بیشتر سریع‌تر از اجسام سبک‌تر به زمین می‌رسند. گالیله برای اثبات حرف خود یک توب ۴۵۳ گرمی و یک توب ۴۵۳۰ گرمی را از بالای برج پیزا رها کرد. جمعیت کثیری از انسان‌ها وجود داشتند که آزمایش گالیله و در نتیجه رسیدن همزمان این دو جسم در یک زمان را به چشم خود دیدند و شهادت دادند. با این آزمایش نظریه قبلی ارسطو رد شد.

نمونه‌هایی از آزمایش‌های ذهنی گالیله که بهتر است در این زمینه دانش آموزان تحقیق کنند.

قانون آونگ گالیله - قاصد آسمان - نظریه خورشید محور و زمین محور - آزمایش گالیله و سطح شیبدار

(الف) برطبق قانون اول نیوتون، جسم تمایل دارد وضعیت سکون خود را حفظ نماید. که با حرکت سریع مقوا، سکه به داخل لیوان می افتد.

(ب) هنگامی که به آرامی بکشم، نیرو انتقال می یابد و نخ از قسمت بالای گوی جدا می گردد. در کشش سریع، لختی جرم گلوله سبب می شود که در بازه زمانی کوتاه فرصت انتقال ضربه به نخ بالایی وجود ندارد. در نتیجه نخ پایین پاره می شود.



پرسش ۳-۲

(الف) چرا حرکت سریع مقوا در شکل (الف)، سبب افتادن سکه در لیوان می شود؟

(ب) چرا در شکل (ب)، اگر به آرامی نیروی وارد بر گوی سنگین را زیاد کنیم نخ بالای گوی باره می شود، اما اگر ناگهان نخ را بکشم، نخ پایین آن باره می شود؟

۴


در سه شکل سمت راست:

با ثابت ماندن اندازه جرم جسم و با افزایش نیرو، مقدار شتاب جسم افزایش می یابد.

در شکل های سمت چپ:

با ثابت ماندن اندازه نیرو و افزایش جرم جسم، مقدار شتاب جسم کاهش می یابد.

در شکل های زیر، قطعه های روی یک سطح افقی بدون اصطکاک قرار دارند. استنباط خود را از این شکل ها بیان کنید.



پرسش ۴-۲


۵

شخصی در حال هل دادن جعبه ای سنگین روی سطح افقی است و این جعبه در جهت این نیرو حرکت می کند. با توجه به آنکه نیروی که شخص به جعبه وارد می کند با نیروی که جعبه به شخص وارد می کند هماندازه است، توضیح دهد جنگله جعبه حرکت می کند؟








در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو باد بگیرید

@davaazdahom kelasema.com



هنگامی که نیروی افقی که شخص به جعبه وارد می کند بیشتر از نیروی افقی که زمین به جعبه وارد کند، باشد. جعبه حرکت می کند.

۲-۲ معرفی برخی از نیروهای خاص		
$W_{\text{زمین}} = mg \rightarrow W_1 = (0.1 \text{ kg})(9.8 \text{ N/kg}) = 0.98 \text{ N}$ $W_{\text{ماه}} = mg \rightarrow W_2 = (0.1 \text{ kg})(1.6 \text{ N/kg}) = 0.16 \text{ N}$ $W_{\text{مریخ}} = mg \rightarrow W_3 = (0.1 \text{ kg})(3.7 \text{ N/kg}) = 0.37 \text{ N}$ $W_1 > W_3 > W_2$ $a = g - \frac{f_D}{m} \xrightarrow{f_D=0} a = g$ $V^2 - V_0^2 = 2g\Delta y \rightarrow V^2 - 0 = 2g h \rightarrow V = \sqrt{2gh}$ با صرفنظر از مقاومت هوا، سرعت برخورد گلوله‌ها با زمین به جرم گلوله‌ها وابسته نیست. $V_1 = V_2$	<p>تمرين ۱-۲</p> <p>(الف) وزن قطعه‌ای طلا به جرم ۱۰۰ گرم را روی سطح زمین بدست آورید. (ب) وزن یک جسم در سطح یک سیاره برابر با نیروی گرانشی است که از طرف آن سیاره بر جسم وارد می‌شود. وزن این قطعه طلا را در سطح ماه و مریخ بدست آورید و با هم مقایسه کنید. $g_{\text{زمین}} = 9.8 \text{ N/kg}$, $g_{\text{ماه}} = 1.6 \text{ N/kg}$, $g_{\text{مریخ}} = 3.7 \text{ N/kg}$</p>	۷
$F_N = mg = 4 \text{ kg} \times 9.8 \text{ N/kg} = 39.2 \text{ N}$ $F_N = mg + F = 4 \text{ kg} \times 9.8 \text{ N/kg} + 20 \text{ N} = 59.2 \text{ N}$ $F_N - F = mg \rightarrow F_N - 20 \text{ N} = 4 \text{ kg} \times 9.8 \text{ N/kg}$ $F_N = 39.2 \text{ N} - 20 \text{ N} = 19.2 \text{ N}$	<p>مثال ۵-۲</p> <p>دو گوی همان‌دازه را که جرم یکی دو برابر دیگری است ($m_1 = 2m_2$) از بالای برجی به ارتفاع h به طور هم‌زمان رها می‌کنیم. با فرض اینکه نیروی مقاومت هوا در طی حرکت دو گوی نابت و پکسان باشد، تندی برخورد کدام گوی با زمین بیشتر است؟</p> <p>تمرين ۲-۲</p> <p>اگر در مثال ۵-۲ از مقاومت هوا صرف نظر نکنیم، سرعت برخورد گوی‌ها با زمین را با هم مقایسه کنید.</p>	۸
$F_N - mg = ma$ $\rightarrow F_N = m(g + a) \rightarrow F_N > mg$ در این حالت ترازو، عددی بزرگ‌تر از اندازه‌ی وزن را نشان می‌دهد.	<p>تمرين ۳-۲</p> <p>همانند شکل، جعبه‌ای به جرم 4.0 kg روی میزی افقی قرار دارد. نیروی عمودی سطح را در حالت‌های نشان داده شده بدست آورید.</p> 	۹
	<p>بررسی ۶-۲</p> <p>در مثال ۲-۶، در هر یک از حالت‌های زیر، عددی را که ترازوی فنری نشان می‌دهد با وزن شخص مقایسه کنید.</p> <p>(الف) آسانسور به طرف بالا شروع به حرکت کند. (ب) آسانسور به طرف پایین شروع به حرکت کند. (پ) آسانسور در حالی که به طرف بالا حرکت می‌کند، متوقف شود. (ث) آسانسور در حالی که به طرف پایین حرکت می‌کند، متوقف شود.</p>	۱۰

$F_N - mg = -ma$ $\rightarrow F_N = m(g - a) \rightarrow F_N < mg$ <p>در این حالت ترازو، عددی کوچکتری از اندازه‌ی وزن را نشان می‌دهد.</p>	 <p>(ب)</p>
$F_N - mg = -ma$ $\rightarrow F_N = m(g - a) \rightarrow F_N < mg$ <p>در این حالت ترازو، عددی کوچکتری از اندازه‌ی وزن را نشان می‌دهد.</p>	 <p>(پ)</p>
$F_N - mg = ma$ $\rightarrow F_N = m(g + a) \rightarrow F_N > mg$ <p>در این حالت ترازو، عددی بیشتر از اندازه‌ی وزن را نشان می‌دهد.</p>	 <p>(ت)</p>



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو یاد بگیرید

@davaazdahom kelasema.com

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

پرسشن ۲

الف) بر اساس قانون سوم نیویتون و آنچه از اصطکاک آموختید، توضیح دهید راه رفتن با شروع از حالت سکون چگونه انجام می‌شود؟

ب) جرا راه رفتن روی یک سطح سُر مانند سطح یعنی به سختی ممکن است؟

۱۱



$$\rightarrow F_1 - f_s = ma = 0 \rightarrow F_1 = f_s = 4\text{ N}$$



$$\rightarrow F_2 - f_s = ma = 0 \rightarrow F_2 = f_s = 8\text{ N}$$



$$\rightarrow F_3 - f_{s,\max} = ma = 0 \rightarrow F_3 = f_{s,\max} = 16\text{ N}$$

(الف)

(ب)


$$f_{s,\max} = \mu_s N \rightarrow \mu_s = \frac{f_{s,\max}}{mg} = \frac{16\text{ N}}{4\text{ kg} \times 9.8\text{ N/kg}} = 0.4$$

ضریب اصطکاک ایستایی تغییر نمی‌کند. زیرا ضریب اصطکاک به اندازه‌ی مساحت سطح تماس جسم بستگی ندارد.



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالعه رو یاد بگیرید

**کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM**



وسایل لازم: نیروسنج- قطعه‌های چوبی مختلف - ترازو

شرح آزمایش:

- ۱- مکعب چوبی را از یک وجه روی سطح افقی قرار دهید.


اگر در شکل ۲-۲، جرم جسم $4/0\text{ kg}$ و بزرگی نیروها $F_1 = 4/0\text{ N}$ ، $F_2 = 8/0\text{ N}$ و $F_3 = 16/0\text{ N}$ باشد،

(الف) بزرگی نیروهای اصطکاک ایستایی در هر حالت چقدر است؟

(ب) ضریب اصطکاک ایستایی را پیدا کنید.

تمرين ۲-۲

۱۲



آزمایش ۲-۱: اندازه‌گیری ضریب اصطکاک ایستایی بین دو جسم
وسایل لازم: نیروسنج، قطعه چوبی به شکل مکعب مستطیل

با وجوده یکنواخت، ترازو، خط‌کش

شرح آزمایش:

- ۱- مکعب چوبی را از طرف وجه بزرگ آن، روی سطح افقی می‌قرار دهد.



۲- نیروسنج را مانند شکل به مکعب چوبی وصل کنید و سر دیگر نیروسنج را با دست بگیرید و به طور افقی بکشید.

۳- نیروی دستگان را به‌آرامی افزایش دهید تا جایی که مکعب چوبی در آستانه لغزیدن قرار گردد. در این حالت عددی را که نیروسنج نشان می‌دهد، در جدول باداشت کنید (برای اینکه دقت شما افزایش باید لازم است آزمایش را چند بار تکرار کنید).

۴- اگرون مکعب چوبی را از طرف وجه کوچکتر روی سطح فرار دهید و مراحل ۲ و ۳ را تکرار کنید.

۵- با اندازه‌گیری جرم مکعب چوبی و استفاده از رابطه $f_{s,\max} = \mu_s N$ را در هر آزمایش محاسبه و در جدول باداشت کنید.

نمایه آزمایش	مساحت سطح تماس قطعه با میز	وزن قطعه:	عددی که نیروسنج نشان می‌دهد ($f_{s,\max}$)	μ_s

هر راه با اعضای گروه خود، نتیجه‌های بدست آمده را تفسیر کنید.

فعالیت ۲-۲

آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد $f_{s,\max}$ متناسب با F_N است.

۱۳



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو باد بگیرید

@davaazdahom kelasema.com

کanal تلگرام گام به گام کل دروس @DAVAAZDAHOM

فعالیت ۲-۳

آزمایشی طراحی کنید که با آن بتوانید :

(الف) نیروی اصطکاک جنبشی وارد بر جسمی مانند یک قطعه چوب در حال لغزش روی سطح را اندازه بگیرید و با استفاده از آن μ_k را بدست آورید.

(ب) بستگی یا عدم بستگی نیروی اصطکاک جنبشی به مساحت سطح تماس دو جسم را تحقیق کنید.

۱۵

(الف) به کمک یک نیروسنج، قطعه چوب را می کشیم تا حرکت کند. در بازه زمانی که قطعه چوب با سرعت ثابت در حال حرکت است، اندازه ی نیروی که نیروسنج نشان می دهد برابر است با نیروی اصطکاک جنبشی، در نتیجه خواهیم داشت.

$$\begin{aligned} \text{Free Body Diagram:} & \quad \vec{F}_N \uparrow, \vec{F} \rightarrow, \vec{f}_k \leftarrow, \vec{W} \downarrow \\ \text{Equations:} & \quad F - f_k = ma \rightarrow F - f_k = 0 \rightarrow F = f_k \\ & \quad F = f_k = \mu_k mg \rightarrow \mu_k = \frac{F}{mg} \end{aligned}$$

نیروی F از روی نیروسنج و m را به کمک ترازو بدست می آوریم.

(ب) از وجه دیگر قطعه چوب، آزمایش را تکرار می کنیم. و سعی می کنیم با سرعت ثابت با نیروسنج قطعه چوب را بکشیم. عددی که نیروسنج نشان می دهد در این شرایط تقریباً برابر حالت قبل می باشد.


نیروی اصطکاک جنبشی به مساحت سطح تماس بستگی ندارد.

$$\begin{aligned} F - f_{s,\max} = ma = 0 \rightarrow F = f_{s,\max} = \mu_s F_N = \mu_s mg \\ \rightarrow F = f_{s,\max} = 0 / 6 \times 75\text{kg} \times 9.8\text{N/kg} = 441\text{N} \end{aligned}$$

تمرین ۲-۵

در مثال قبل اگر ضرب اصطکاک ایستایی بین جعبه و زمین 60% و جسم در ابتدا ساکن باشد، حداقل نیروی افقی لازم برای به حرکت در آوردن جعبه چقدر است؟

۱۶



(الف) تعدادی فنر با ضخامت‌های مختلف تهیه می‌کنیم. هر چه فنر انعطاف پذیر تر باشد. سختی (K) کوچکتر و برای فنر سفت (K) بیشتر است.


(ب) فنر را مطابق شکل (۱) به سقف آویزان می‌کنیم و سپس به انتهای آن، وزنهای با جرم مشخص آویزان می‌نماییم. در حالت تعادل، به کمک خط‌کش، تغییرات طول فنر را اندازه می‌گیریم.

با توجه به این مطلب که، نیروی که از طرف فنر به وزنه وارد می‌شود با نیروی که از طرف زمین به جسم وارد می‌شود برابر است. خواهیم داشت.

$$F_e = w \rightarrow k\Delta y = mg \rightarrow k = \frac{mg}{\Delta y}$$

سپس در چندین نوبت فنرهای مختلف را مطابق شکل آزمایش کرده و هر بار با توجه به رابطه مقدار K را بدست می‌وریم.

همچنین می‌توان آزمایش را با جرم‌های مختلف تکرار کرد، و k‌های مختلفی را بدست آورد. از اعداد بدست آمده میانگین گرفته و عدد دقیقتری برای k بدست آورد.



$$T - mg = ma$$

$$T - 16\text{kg} \times 9.8\text{N/kg} = 10.0\text{kg} \times 1.2\text{m/s}^2$$

$$T = 156 / 8\text{N} + 12\text{N} = 176 / 8\text{N}$$

فعالیت ۴-۲
تعدادی فنر متفاوت تهیه کنید. (الف) سختی آنها را مقایسه کنید. (ب) با طراحی یک آزمایش، ثابت هر فنر را به دست آورید.



کلاس ما



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو باد بگیرید

@davaazdahom kelasema.com

۱۷



تمرین ۲-۶

کارگری یک سطل محتوی مصالح به جرم $16/0\text{kg}$ را با طناب سبکی به طرف بالا می‌کند.
اگر شتاب رو به بالای سطل $1/2\text{m/s}^2$ باشد، نیروی کشش طناب چقدر است؟

۱۸

کانال تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

<p style="text-align: right;">الف)</p>	کنش نیروی که از طرف زمین به سیب وارد می‌شود. نیروی که از طرف شاخه به سیب وارد می‌شود.
<p style="text-align: right;">ب)</p>	کنش نیروی که از طرف زمین به سیب وارد می‌شود. نیروی که از طرف هوا به سیب وارد می‌شود.
واکنش نیروی که از طرف زمین به سیب وارد می‌شود. نیروی که از طرف هوا به سیب وارد می‌شود.	واکنش نیروی که از طرف سیب به شاخه وارد می‌شود. نیروی که از طرف شاخه به سیب وارد می‌شود.
الف) برطبق قانون اول نیوتون (لختی) جسم تمایل دارد حالت سکون و یا حرکت یکنواخت خود را بر روی خط راست حفظ کند. در حالتی که خودرو ناگهان شروع به حرکت می‌کند، خودرو به سمت جلو رفتہ و اجسام داخل خودرو تمایل دارند حالت خود را حفظ کنند. به همین دلیل شخص به صندلی فشرده می‌شود. در حالتی که خودرو ناگهان توقف می‌کند، اجسام داخل خودرو تمایل دارند حالت رو به جلوی خود را حفظ کنند در نتیجه اجسام به سمت جلو پرت می‌شوند.	الف) سیبی را در نظر بگیرید که به شاخه درختی آویزان است و سیب از درخت جدا می‌شود. الف) با رسم شکل نیروهای وارد بر سیب را قبل و بعد از جداشدن از درخت نشان دهید. ب) در هر حالت واکنش این

۱-۲ و ۲-۲ قوانین حرکت نیوتون و معرفی برخی از نیروهای خاص

۱. سیبی را در نظر بگیرید که به شاخه درختی آویزان است و سیب از درخت جدا می‌شود.

الف) با رسم شکل نیروهای وارد بر سیب را قبل و بعد از جداشدن از درخت نشان دهید. ب) در هر حالت واکنش این



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو یاد بگیرید

@davaazdahom kelasema.com

۱۹



۲. وقتی در خودروی ساکنی نشسته‌اید و خودرو ناگهان شروع به حرکت می‌کند، به صندلی فشرده می‌شوید. همچنین اگر در خودروی در حال حرکتی نشسته باشید، در توقف ناگهانی به جلو برتاب می‌شوید.

الف) علت این پدیده‌ها را توضیح دهید. ب) نقش کمرندهایمنی و کیسه‌هوا در کم شدن آسیب‌ها در تصادفات را بیان کنید.

۲۰

ب) در هنگام توقف یا ترمز ناگهانی اتومبیل، سرنشین بنا بر خاصیت لختی در مسیر حرکت به راه خود ادامه می‌دهد و بسمت شیشه جلو پرتاب می‌شود. کمربند ایمنی و یا کیسه‌ی هوا، سرنشین را با خودرو یک پارچه‌می‌کند و شتاب حرکت سرنشین در رخدادهای ناگهانی شتاب خودرو می‌شود.

$$F_N - mg = 0 \rightarrow F_N = mg$$

$$\rightarrow F_N = 50\text{ kg} \times 9.8\text{ N/kg} = 490\text{ N}$$

$$F_N - mg = ma = 0 \rightarrow F_N = mg$$

$$\rightarrow F_N = 50\text{ kg} \times 9.8\text{ N/kg} + 1/2\text{ m/s}^2 \times 50\text{ kg} = 490\text{ N}$$

$$F_N - mg = ma \rightarrow F_N = m(g + a)$$





$$F_N = 50\text{ kg} \times (9.8\text{ N/kg} + 1/2\text{ m/s}^2)$$

$$F_N = 550\text{ N}$$

$$F_N - mg = -ma \rightarrow F_N = m(g - a)$$

$$F_N = 50\text{ kg} \times (9.8\text{ N/kg} - 1/2\text{ m/s}^2)$$

$$F_N = 430\text{ N}$$



۳۴. داش آموزی به جرم 50 kg روی یک ترازوی فنری در آسانسور ایستاده است. در هر یک از حالت‌های زیر این ترازو چند نیوتون را نشان می‌دهد؟ ($g = 9.8\text{ m/s}^2$)

(الف) آسانسور ساکن است.

(ب) آسانسور با سرعت ثابت حرکت می‌کند.

(پ) آسانسور با شتاب $1/2\text{ m/s}^2$ به طرف بالا شروع به حرکت می‌کند.

(ت) آسانسور با شتاب $1/2\text{ m/s}^2$ به طرف پائین شروع به حرکت می‌کند.

۲۱



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالعه رویاد بگیرید


@davaazdahom kelasema.com

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

الف) جسم ساکن است.

$$F - f_s = 0$$


$$\rightarrow f_s = F = 20.0 \text{ N}$$



ب) جسم در آستانه حرکت است.

$$F - f_{s,\max} = 0$$

$$\rightarrow f_{s,\max} = F = \mu_s F_N$$




$$\mu_s = \frac{F}{mg} = \frac{30.0 \text{ N}}{9.0 \text{ kg} \times 9.8 \text{ N/kg}} = 0.34$$

پ) جسم در با شتاب ثابت در حرکت است.

$$F - f_k = ma$$

$$F - \mu_k mg = ma \rightarrow$$

$$20.0 \text{ N} - 0.2 \times 5.0 \text{ kg} \times 9.8 \text{ N/kg} = 5.0 \text{ kg} a \rightarrow a = 2 / 0.4 \text{ N/kg}$$



۱۴. در شکل نشان داده شده، شخص با نیروی ۲۰.۰ N جسم ۹۰٪ کیلوگرمی را هُل می‌دهد، اما جسم ساکن می‌ماند. ولی وقتی با نیروی ۳۰.۰ N جسم را هُل می‌دهد، جسم در آستانه حرکت قرار می‌گیرد.

الف) نیروی اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح در هر حالت چقدر است؟

ب) ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و سطح چقدر است؟

پ) اگر پس از حرکت، شخص با نیروی ۲۰.۰ N جسم را هُل دهد و ضریب اصطکاک جنبشی بین سطح و جسم ۰.۲۰ باشد، شتاب حرکت جسم چقدر خواهد شد؟

۲۲



کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

$$F_{\text{re}} = m_1 g \rightarrow k(L_1 - L_0) = m_1 g \quad (1)$$


$$F_{\text{re}} = m_2 g \rightarrow k(L_2 - L_0) = m_2 g \quad (2)$$

$$(m_2 - m_1)g = k(L_2 - L_0)$$

$$\rightarrow k = \frac{(m_2 - m_1)g}{(L_2 - L_0)}$$

$$\rightarrow k = \frac{(\Delta \text{kg} - \epsilon \text{kg}) \times 9.8 \text{ N/kg}}{(15 \text{ cm} - 14 \text{ cm})} = 9.8 \text{ N/cm}$$

$$k(L_1 - L_0) = m_1 g \rightarrow 9.8 \text{ N/cm} (14 \text{ cm} - L_0) = 4 \text{ kg} \times 9.8 \text{ N/kg} \rightarrow L_0 = 10 \text{ cm}$$



(الف)



۴. در شکل رو به رو وقتی وزن kg ۴/۰ را به فنر آویزان می‌کنیم، طول فنر ۱۴ cm می‌شود، وقتی وزن kg ۵/۰ را به فنر آویزان می‌کنیم، طول فنر ۱۵ cm می‌شود.

(الف) ثابت فنر چقدر است؟ (ب) طول عادی فنر (بدون وزن) چند سانتی‌متر است؟

۲۳



(الف)

واکنش

کنش

نیروی که خودرو به زمین وارد می‌کند. \vec{W}'

\vec{W}

نیروی عمودی تکیه گاه سطح جاده به خودرو وارد می‌کند. \vec{F}'_N

\vec{F}_N

در وضعیت لغزش، نیروی موازی سطح از طرف خودرو در جهت حرکت به زمین وارد می‌شود. \vec{f}'_k

\vec{f}_k

نیروی که از مولکول‌های هوا به خودرو در خلاف جهت حرکت وارد می‌شود. \vec{f}'

۴. در هر یک از موارد زیر، نیروهای وارد بر جسم را مشخص کنید. واکنش هر یک از این نیروها به چه جسمی وارد می‌شود؟ (الف) خودرویی با سرعت ثابت در یک مسیر مستقیم افقی در حال حرکت است.

(ب) کشتنی‌ای با سرعت ثابت در حال حرکت است.

(پ) قایقرانی در حال بارو زدن است.

(ت) چتربازی در هوای آرام و در امتداد قائم در حال سقوط است.

(ث) هواپیمایی در یک سطح بروازی افقی با سرعت ثابت در حال حرکت است.

(ج) تو



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالعه رو یاد بگیرید

@davaazdahom kelasema.com



(ب)



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو باد بگیرید

@davaazdahom kelasema.com

۷. در هر یک از موارد زیر، نیروهای وارد بر جسم را مستحضر کنید. واکنش هر یک از این نیروها به چه جسمی وارد می شود؟
 الف) خودروی با سرعت ثابت در یک مسیر مستقیم افقی در حال حرکت است.

ب) کشته ای با سرعت ثابت در حال حرکت است.

پ) قایقرانی در حال پارو زدن است.

ت) چتربازی در هوای آرام و در امتداد قائم در حال سقوط است.

ث) هواپیمایی در یک سطح پروازی افقی با سرعت ثابت در حال حرکت است.

ج) تویی در راستای قائم به زمین برخورد می کند و بر می گردد.

واکنش

کنش

نیروی که زمین به کشته وارد می کند. \vec{W}

نیروی که کشته به زمین وارد می کند.

نیروی که از طرف آب (نیروی شناوری) به کشته وارد می شود.
 \vec{F}_b'

نیروی که از طرف آب (نیروی شناوری) به کشته وارد می شود.

نیروی که در جهت مخالف حرکت از طرف آب و
 \vec{f}'
 مولکول های هوا به سطح کشته وارد می شود.نیروی که در جهت مخالف حرکت از طرف آب و
 \vec{f}'
 مولکول های هوا به سطح کشته وارد می شود.

(پ)

واکنش

کنش

نیروی که زمین به قایق به زمین وارد می کند. \vec{W}

نیروی که زمین به قایق به زمین وارد می کند.


نیروی که از طرف آب (نیروی شناوری) به قایق وارد
 \vec{F}_b'
 می شود.

نیروی که از طرف آب (نیروی شناوری) به قایق وارد می شود.

نیروی موازی در جهت مخالف حرکت قایق به آب و
 \vec{f}'
 مولکول های هوا به سطح قایق وارد می شود.نیروی موازی در جهت مخالف حرکت از طرف آب و
 \vec{f}'
 مولکول های هوا به سطح قایق وارد می شود.نیروی که از طرف آب به پارو وارد می کند.
 \vec{F}'

کanal تلگرام گام به گام کل دروس

@DAVAAZDAHOM



(ت)

واکنش

کنش

نیروی که چترباز به زمین وارد می‌کند.	\vec{W}'
--------------------------------------	------------

نیروی که از طرف مولکولهای هوا به چترباز وارد می‌شود.	\vec{F}_b'
--	--------------



(ت)

واکنش

کنش

نیروی که زمین به هواپیما وارد می‌کند.	\vec{W}
---------------------------------------	-----------

نیروی که از طرف مولکولهای هوا رو به بالا (نیروی شناوری) به هواپیما وارد می‌شود.	\vec{F}_b'
---	--------------

نیروی که در جهت مخالف حرکت از مولکول‌های هوا به سطح هواپیما وارد می‌شود.	\vec{f}'
--	------------



کلاس ما



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو باد بگیرید

@davaazdahom kelasema.com

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

 هنگام پایین آمدن	ج)
واکنش	کنش
نیروی که توپ به زمین وارد می‌کند.	\vec{W}
نیروی که زمین به توپ وارد می‌کند.	\vec{W}'
نیروی که از طرف مولکول‌های هوای رو به بالا به توپ وارد می‌شود.	\vec{F}_b'
 نیروی مقاومت هوای	\vec{F}_b
هنگام بالا رفتن	
نیروی که زمین به توپ وارد می‌کند.	\vec{W}
نیروی که از طرف مولکول‌های هوای رو به پایین به توپ وارد می‌شود.	\vec{F}_b'



کلاس ما




در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو یاد بگیرید


 @davaazdahom kelasema.com

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

$v_0 = 72 \text{ km/h} = 72 \div 3 / 6 \text{ m/s} = 20 \text{ m/s}$ $v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x \rightarrow v^2 - (20 \text{ m/s})^2 = 2a \times 20 \text{ m}$ $a = -\frac{40}{40} \text{ m/s}^2 = -10 \text{ m/s}^2$ $v = at + v_0 \rightarrow 0 = -10(\text{m/s})t + 20 \text{ m/s} \rightarrow t = 2 \text{ s}$ $F - f_k = ma \rightarrow 20 - f_k = -10 \left(\text{m/s}^2 \right) \times 1200 \text{ kg} \rightarrow f_k = 12000 \text{ N}$	<p>(الف)</p> <p>(ب)</p> <p>(پ)</p>	<p>۲۵</p> <p>۶. راتنده خودرویی که با سرعت 72 km/h در یک مسیر مستقیم در حال حرکت است، با دیدن مانع اقدام به ترمز می‌کند و خودرو پس از طی مسافت 20 m متوقف می‌شود.</p> <p>الف) شتاب خودرو در مدت ترمز چقدر است؟</p> <p>ب) از لحظه ترمز تا توقف کامل خودرو، چقدر طول می‌کشد؟</p> <p>پ) نیروی اصطکاک بین لاستیک‌ها و سطح چقدر است؟ جرم خودرو را 1200 kg بگیرید.</p>
<p>فرض می‌کنیم شخصی به وزن 500 N از بالگرد به بیرون می‌پردازد. بعد از پریدن چتر باز، سرعت اولیه آن بسیار ناچیز است و تندری و مقاومت هوا افزایش می‌یابد. (جهت حرکت مثبت در نظر گرفته شده است).</p> <p>بعد از گذشت ثانیه‌ها بیشتر</p>  <p>در لحظه ترک از بالگرد</p> <p>پس از مدتی مقاومت هوا با وزن چتر باز برابر شده و نیروی خالص وارد بر چتر باز صفر می‌شود و چتر باز با تندری ثابتی به طرف زمین حرکت می‌کند.</p>	<p>۲۶</p> <p>۷. چتر بازی از یک بالگرد تقریباً ساکن که در ارتفاع نسبتاً زیادی قرار دارد، به بیرون می‌پردازد و پس از مدتی چتر خود را باز می‌کند و در امتداد قائم سقوط می‌کند. حرکت چتر باز را از لحظه پرش تا رسیدن به زمین تحلیل کنید و نموداری تقریبی از تندری آن بر حسب زمان رسم کنید.</p>	





کلاس ما

در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو بیاد بگیرید



@davaazdahom kelasema.com

کanal تلگرام گام به گام کل دروس

@DAVAAZDAHOM

<p>(الف)</p> $\vec{F}_{\text{net}} = m \vec{a}$ $F_N - F_1 - W = m a = 0 \rightarrow F_N = F_1 + W$ <p>با افزایش F_2، نیروی عمودی سطح وارد بر جعبه افزایش می‌یابد.</p> $F_1 - F_s = m a = 0 \rightarrow F_1 = F_s$ <p>$f_{s,\text{max}} = \mu_s F_N \rightarrow f_{s,\text{max}} = \mu_s (F_1 + W)$</p> <p>$F_2$، $f_{s,\text{max}}$ مقدار افزایش می‌یابد.</p> <p>حالص وارد بر جسم در راستای X و Y صفر است. چون جسم در این دو راستا حرکتی ندارد.</p> $\vec{F}_{\text{net}} = m \vec{a} \rightarrow F = m a$ $\rightarrow F = (5.0 \text{ kg}) (2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}) = 10 \text{ N}$ $\vec{F}_{\text{net}} = m \vec{a} \rightarrow F - F_k = m a$ $\rightarrow F - \mu_k W = m a$ $F - (0.20) (5.0 \text{ kg}) (9.8 \frac{\text{N}}{\text{kg}}) = (5.0 \text{ kg}) (2 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$ $\rightarrow F - (9.8 \text{ N}) = 10 \text{ N} \rightarrow F = 19.8 \text{ N}$	<p>۴. در شکل زیر، نیروی F_1 به بزرگی $N/0$ بر جعبه وارد شده است، اما جعبه همچنان ساکن است. اگر در همین حالت بزرگی \vec{F}_2 که جعبه را به زمین می‌فشارد از صفر شروع به افزایش کند، کمیت‌های زیر چگونه تغییر می‌کنند؟</p> <p>(الف) اندازه نیروی عمودی سطح وارد بر جعبه (ب) اندازه نیروی اصطکاک استاندارد (پ) اندازه پیشینه نیروی (ت) نیروی خالص وارد</p>
<p>(الف)</p> <p>(ب)</p> <p>۵. می‌خواهیم به جسمی که جرم آن 5 kg است، شتاب 2 m/s^2 بدهیم. در هر یک از حالت‌های زیر، نیرویی را که باید به جسم وارد کنیم محاسبه کنید.</p> <p>(الف) جسم روی سطح افقی بدون اصطکاک حرکت کند. (ب) جسم روی سطح افقی با ضرب اصطکاک 0.2 به طرف راست حرکت کند، و شتابش نیز به طرف راست باشد. (پ) جسم در راستای قائم با شتاب رو به بالا شروع به حرکت کند. (ت) جسم در راستای قائم با شتاب رو به پائین شروع به حرکت کند.</p>	<p>۲۷</p>
<p>(الف)</p> <p>(ب)</p> <p>۵. می‌خواهیم به جسمی که جرم آن 5 kg است، شتاب 2 m/s^2 بدهیم. در هر یک از حالت‌های زیر، نیرویی را که باید به جسم وارد کنیم محاسبه کنید.</p> <p>(الف) جسم روی سطح افقی بدون اصطکاک حرکت کند. (ب) جسم روی سطح افقی با ضرب اصطکاک 0.2 به طرف راست حرکت کند، و شتابش نیز به طرف راست باشد. (پ) جسم در راستای قائم با شتاب رو به بالا شروع به حرکت کند. (ت) جسم در راستای قائم با شتاب رو به پائین شروع به حرکت کند.</p>	<p>۲۸</p>

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

$\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a} \rightarrow F - W = ma \rightarrow F - mg = ma$ $F - (\cancel{5.0 \text{ kg}})(9.8 \frac{\text{N}}{\text{kg}}) = (5.0 \text{ kg})(2.0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$ $\rightarrow F - (49 \text{ N}) = 10 \text{ N} \rightarrow F = 59 \text{ N}$ $W - F = ma \rightarrow mg - F = ma$ $(\cancel{5.0 \text{ kg}})(9.8 \frac{\text{N}}{\text{kg}}) - F = (5.0 \text{ kg})(2.0 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$ $\rightarrow (49 \text{ N}) - F = 10 \text{ N} \rightarrow F = 39 \text{ N}$ <p style="text-align: center;">(ب)</p>  <p style="text-align: center;">(ت)</p> 
<p style="text-align: center;">(الف)</p> $\vec{F}_{\text{net}} = m\vec{a} \rightarrow -f_k = ma \rightarrow -\mu_k F_N = ma$ $-\mu_k mg = ma \rightarrow a = -\mu_k g \rightarrow a = -(0.2)(9.8 \frac{\text{N}}{\text{kg}}) = -1.96 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ <p>جسم متوقف شده است، بنابراین $V = 0$ است.</p> $V^r - V^o = 2a\Delta x$ $0 - (1.0 \frac{\text{m}}{\text{s}})^r = 2(-1.96 \frac{\text{N}}{\text{kg}})\Delta x \rightarrow \Delta x = 25 / 51 \text{ m}$ <p>ب) مطابق رابطه $a = -\mu_k g$، شتاب حرکت به جرم جسم بستگی ندارد و مسافت پیموده شده ثابت می‌ماند.</p>



II. قطعه‌چوبی را با سرعت افقی $10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ روی سطحی افقی پرتاب می‌کنیم. ضریب اصطکاک جنبشی بین چوب و سطح 0.2 است.

الف) چوب پس از پیمودن چه مسافتی می‌ایستد؟

ب) اگر از یک قطعه‌چوب دیگر استفاده کنیم که جرم آن دو برابر جرم قطعه‌چوب اول و ضریب اصطکاک جنبشی آن با سطح افقی با اولی یکسان باشد و با همان سرعت پرتاب شود، مسافت پیموده شده آن چند برابر می‌شود؟

۲۹

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

$F - mg = 0 \rightarrow k\Delta L = mg$ $\rightarrow 2 \cdot (N/cm)(L_1 - 12\text{cm}) = 2\text{kg} \times (9.8\text{N/kg})$ $\rightarrow L_1 = 12 / 9.8\text{cm}$	<p>(الف)</p>
$F - mg = 0 \rightarrow k\Delta L = mg$ $\rightarrow 2 \cdot (N/cm)(L_2 - 12\text{cm}) = 2\text{kg} \times (9.8\text{N/kg})$ $\rightarrow L_2 = 12 / 9.8\text{cm}$	<p>(ب)</p>
$F - mg = -ma \rightarrow k\Delta L = m(g - a)$ $\rightarrow 2 \cdot (N/cm)(L_3 - 12\text{cm}) = 2\text{kg} \times [(9.8 - 2)\text{N/kg}]$ $\rightarrow L_3 = 12 / 7.8\text{cm}$	<p>(پ)</p>
$F - mg = ma \rightarrow k\Delta L = m(g + a)$ $\rightarrow 2 \cdot (N/cm)(L_4 - 12\text{cm}) = 2\text{kg} \times [(9.8 + 2)\text{N/kg}]$ $\rightarrow L_4 = 13 / 18\text{cm}$	<p>(ت)</p>

۱۴) وزنای به جرم 2kg را به انتهای فنری به طول 12cm که ثابت آن 2N/cm است می‌بندیم و فنر را از سقف یک آسانسور آویزان می‌کنیم. طول فنر را در حالت‌های زیر محاسبه کنید.
الف) آسانسور ساکن است.

ب) آسانسور با سرعت ثابت 2m/s رو به پایین در حرکت است.

پ) آسانسور با شتاب ثابت 2m/s^2 از حال سکون رو به پایین شروع به حرکت کند.



ت) آسانسور با شتاب ثابت 2m/s^2 از حال سکون رو به بالا شروع به حرکت کند.

۳۰



کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM



<p>الف) زمان واکنش و تندی خودرو</p> $\Delta x = vt \rightarrow 18m = v \times 0.6s \rightarrow v = 30m/s$ <p>(ب)</p> $x = \left(\frac{v+v}{2}\right)t = \left(\frac{0+30m/s}{2}\right) \times 0.5s \rightarrow 75m$ <p>(پ)</p> $a = \frac{v-v}{t} = \frac{0-30m/s}{0.5s} \rightarrow a = 60m/s^2$ <p>(ت)</p> $F_{net} = ma \rightarrow F_{net} = 1500kg \times 60N/kg \rightarrow F_{net} = -9000N$	<p>۳۱</p> <p>برای یک راننده داشتن کل مسافت توقف خودرو اهمیت دارد. همان‌طور که شکل نشان می‌دهد کل مسافت توقف، دو قسمت دارد: مسافت واکنش (مسافتی که خودرو از لحظه دیدن مانع ناترمه‌گرفتن طی می‌کند) و مسافت ترمز (مسافتی که خودرو از لحظه ترمز‌گرفتن تا توقف کامل طی می‌کند).</p> <p>(الف) دو عامل مؤثر در مسافت واکنش را بنویسید.</p> <p>ب) زمان واکنش راننده‌ای $0.6s$ است. در طی این زمان، خودرو مسافت $18m$ را طی می‌کند. با فرض ثابت بودن سرعت در این مدت، اندازه آن را حساب کنید.</p> <p>ب) اگر در این سرعت راننده ترمز کند و خودرو پس از $0.5s$ متوقف شود، مسافت ترمز و شتاب خودرو را حساب کنید.</p> <p>ت) وقتی خودرو ترمز می‌کند، نیروی خالص وارد بر آن چقدر است؟ جرم خودرو را $1500kg$ فرض کنید.</p>
<p>فیزیوی خالص عمودی حاصل از سطح زمین فیزیوی مقاومت هوای فیزیوی اصطکاک فیزیوی کشش</p> <p>(الف)</p> $T - f_k - f = ma = 0 \rightarrow T = f_k + f = 380N + 220N = 600N$ <p>(ب)</p> $T' - f_k - f = ma \rightarrow T' = 2(N/kg) \times 1500kg + 600N = 3600N$	<p>۳۲</p> <p>یک خودروی باری با طناب افقی محکمی، یک خودروی سواری به جرم $1500kg$ را می‌کشد. نیروی اصطکاک و مقاومت هوای در مقابل حرکت خودروی سواری $220N$ و $380N$ است.</p> <p>(الف) اگر سرعت خودرو ثابت باشد نیروی کشش طناب چقدر است؟</p> <p>ب) اگر خودرو با شتاب ثابت $2m/s^2$ به طرف راست کشیده شود، نیروی کشش طناب چقدر است؟</p>
<p>فیزیوی اصطکاک ایستایی فیزیوی عومودی تکیه گاه فیزیوی وزن</p> <p>(الف)</p> $mg - f_s = ma = 0 \rightarrow f_s = mg$ $\rightarrow f_s = 2/5kg \times 9.8N/kg = 24.5N$ <p>ب) خیر - نیروی اصطکاک تغییر نمی‌کند.</p> <p>(ب)</p> $F_N - F = 0 \rightarrow F = F_N$	<p>۳۳</p> <p>۱۰ کتابی را مانند شکل با نیروی عمودی F به دیوار قائمی فشرده و ثابت نگه داشته‌ایم.</p> <p>(الف) نیروهای وارد بر کتاب را رسم کنید.</p> <p>ب) اگر جرم کتاب $2/5kg$ باشد، اندازه نیروی اصطکاک را به دست آورید.</p> <p>ب) اگر کتاب را بیشتر به دیوار بفشاریم، آیا نیروی اصطکاک تغییر می‌کند؟ با این کار چه نیروهایی افزایش می‌یابد؟</p>

۳-۲ تکانه و قانون دوم نیوتن	
$k = \frac{1}{2}mv^2$ $P = mv \rightarrow v = \frac{P}{m}$ $\left. \begin{array}{l} k = \frac{1}{2}m\left(\frac{P}{m}\right)^2 \\ \rightarrow k = \frac{1}{2}m \cdot \frac{P^2}{m^2} \end{array} \right\} \rightarrow k = \frac{P^2}{2m}$	تمرين ۷-۲ نشان دهد بین اندازه تکانه (P) و انرژی جنبشی (K) جسمی به جرم m ، رابطه $K = \frac{P^2}{2m}$ برقرار است.
$\Delta P = m\Delta v = m(v_2 - v_1)$ $\Delta P = 0.28 \text{ kg} \times (-22 \text{ m/s} - 15 \text{ m/s})$ $\Delta P = -10 / 36 \text{ kg m/s}$ <p style="text-align: right;">الف)</p>  <p style="text-align: right;">ب)</p> $\bar{F} = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{-10 / 36 \text{ kg m/s}}{0.06 \text{ s}} = -172 / 6 \text{ N}$	<p style="color: red;">۳-۳ تکانه و قانون دوم نیوتن</p> <p>۱۷. توپی به جرم $g = 28 \text{ g}$ با تندی $v = 22 \text{ m/s}$ به طور افقی به بازیکن نزدیک می شود. بازیکن با مشت به توپ ضربه می زند و باعث می شود توپ با تندی $v = 28 \text{ m/s}$ در جهت مخالف برگردد.</p> <p>(الف) اندازه تغییر تکانه توپ را محاسبه کنید.</p> <p>(ب) اگر مشت بازیکن $s = 6 \text{ m}$ با توپ در تماس باشد، اندازه نیروی متوسط وارد بر مشت بازیکن از طرف توپ را به دست آورید.</p> <p>۱۸. شکل زیر، منحنی نیروی خالص برحسب زمان را برای توپ پیسالی که با چوب پیسال به آن ضربه زده شده است، نشان می دهد. تغییر تکانه توپ و نیروی خالص متوسط وارد بر آن را به دست آورید.</p>
$S_{(F-t)} = \Delta P$ $S_{(F-t)} = \frac{1}{2} (v/5s - 18) \times 10^{-3} \times 20 \times 10^3 \text{ N}$ $s_{(F-t)} = \Delta P = 15 \text{ N.s}$ $\bar{F} = \frac{\Delta P}{\Delta t} = \frac{15 \text{ N.s}}{1/5 \times 10^{-3} \text{ s}} = 10000 \text{ N}$ 	


کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

۴-۲ حرکت دایره ای یکنواخت		
زیرا در حرکت دایره ای یکنواخت، تندی متوجه در بازه های زمانی برابر، ثابت است. پس مسافت های یکسانی را طی می کند.	بررسی ۸-۲ چرا در حرکت دایره ای یکنواخت، ذره در بازه های زمانی برابر، مسافت های یکسانی را طی می کند؟	۳۷
$T = \frac{t}{N} = \frac{1\text{ min}}{5} = \frac{60\text{ s}}{5} = 12\text{ s}$ $N' = \frac{t}{T} = \frac{3\text{ s}}{12\text{ s}} = \frac{1}{4}$ مسافت طی شده $= \frac{1}{4}(2\pi r)$	بررسی ۹-۲ دوره ساعتی شمار، دقیقه شمار و ساعت شمار یک ساعت ساعتی چیست؟	۳۸
		مثال ۱۵-۲ یک دیسک گردان در شهریاری را در نظر بگیرید که توسط یک موتور الکتریکی در هر دقیقه ۵ دور می چرخد. فرض کنید افرادی در فاصله های $1/5\text{ m}$ ، $2/5\text{ m}$ و $3/5\text{ m}$ از مرکز آن قرار دارند. تندی این افراد را بدست بیاورید و با هم مقایسه کنید.
$r_1 = 1\text{ m} \rightarrow L_1 = \frac{1}{2}\pi r_1 = \frac{1}{2} \times 3 / 14 \times 1\text{ m} = 1/57\text{ m}$ مسافت فرد شماره (۱) $r_2 = 2\text{ m} \rightarrow L_2 = \frac{1}{2}\pi r_2 = \frac{1}{2} \times 3 / 14 \times 2\text{ m} = 3/57\text{ m}$ مسافت فرد شماره (۲) $r_3 = 3\text{ m} \rightarrow L_3 = \frac{1}{2}\pi r_3 = \frac{1}{2} \times 3 / 14 \times 3\text{ m} = 4/57\text{ m}$ مسافت فرد شماره (۳)	تمرين ۸-۲ مسافتی را که هر یک از افراد در مثال بالا در مدت $5/2\text{ s}$ طی کرده اند محاسبه کنید.	۳۹
$v = \frac{2\pi r}{T}$ $a = \frac{v^2}{r}$	شکل ۴-۲ نشان دهد در حرکت دایره ای یکنواخت، شتاب مرکزگرا از رابطه $a_c = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$ نیز بدست می آید که در آن T و r به ترتیب دوره تناوب و شعاع دایره است.	۴۰

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

$r_1 = 33\text{m} \rightarrow a = \frac{v^2}{r_1} = \frac{(34\text{m/s})^2}{33\text{m}} = 35.03 \text{ m/s}^2$ $r_2 = 24\text{m} \rightarrow a = \frac{v^2}{r_2} = \frac{(34\text{m/s})^2}{24\text{m}} = 48.16 \text{ m/s}^2$	<p>تمرین ۹-۲</p>  <p>شکل رو به رو مسیر حرکت سورتمه‌ای را در مسابقه المپیک زمستانی شان می‌دهد. سورتمه روی یک سطح افقی در حال حرکت است. اگر تندی حرکت سورتمه در کل مسیر 34m/s باشد، شتاب مرکزگرای آن را در هر یک از بیچه را بدست آورید.</p>
$F_y = 0 \rightarrow N - mg = 0 \rightarrow N = mg$ $F = f_s = \mu_s N = \mu_s mg$ $F = m \frac{v^2}{r}$ $v = \sqrt{\mu_s rg} \rightarrow v = \sqrt{1 \times 5.0 \text{m} \times 9.8 \text{m/s}^2} = 22.13 \text{ m/s}$	<p>تمرین ۱۰-۲</p>  <p>خودرویی به جرم 1500 kg را در نظر بگیرید که می‌خواهد در یک بیچ سطح افقی به شعاع 5.0 m بدون آنکه بلغزد، دور بزند. اگر ضرب اصطکاک ایستایی بین لاستیک خودرو می‌خواهد یک‌چهارم دایره را طی کند، می‌توانیم خودرو را به صورت یک ذره در نظر بگیریم که در یک‌چهارم دایره، حرکت دایره‌ای یکنواخت دارد. در راستای عمود بر سطح، نیروی وزن و نیروی عمودی سطح بر خودرو وارد می‌شود و نیروی اصطکاک ایستایی که عمود بر راستای حرکت است، مانع از لغزش خودرو شده و به طرف مرکز بیچ، بر خودرو وارد می‌شود. این نیرو شتاب مرکزگرای لازم را برای دور زدن تأمین می‌کند.</p>
$T = \frac{t}{N} = \frac{60\text{s}}{1000} = 0.06\text{s}$ (الف) $r_1 = 2\text{m} \rightarrow v_1 = \frac{2\pi r_1}{T} = \frac{2 \times 3 / 14 \times 2\text{m}}{0.06\text{s}} = 20.9 / 23 \text{ m/s}$ (ب) $r_2 = 4\text{m} \rightarrow v_2 = \frac{2\pi r_2}{T} = \frac{2 \times 3 / 14 \times 4\text{m}}{0.06\text{s}} = 41.8 / 66 \text{ m/s}$ (پ) $r_1 = 2\text{m} \rightarrow a_{r1} = \frac{v_1^2}{r_1} = \frac{(20.9 / 23 \text{ m/s})^2}{2\text{m}} = 2190.9 / 52 \text{ m/s}^2$ $r_2 = 4\text{m} \rightarrow a_{r2} = \frac{v_2^2}{r_2} = \frac{(41.8 / 66 \text{ m/s})^2}{4\text{m}} = 43819 / 0.4 \text{ m/s}^2$	<p>۱۱. پره‌های یک بالگرد در هر دقیقه، 10000 دور می‌چرخد. طول پره‌ها 4m فرض کنید و کمیت‌های زیر را برای پره‌ها محاسبه کنید. (الف) دوره تناوب پره‌ها (ب) تندی در سطح و نوک پره‌ها (پ) شتاب مرکزگرای در سطح و نوک پره‌ها</p>
	 <p>کلاس ما</p> <p>در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو یاد بگیرید</p> <p>@davaazdahom kelasema.com</p>

$$\begin{aligned} v &= ۵۴ \frac{\text{km}}{\text{h}} = ۵۴ \times \frac{۱}{\frac{۳}{۶} \text{s}} = ۱۵ \text{m/s} \\ f_s &= \mu_s N = \mu_s mg \\ F &= m \frac{v^r}{r} \\ \rightarrow \mu_s &= \frac{v^r}{rg} = \frac{(15 \text{m/s})^r}{9.8(m/\text{s}^r) \times ۵۰\text{m}} \approx 0.46 \end{aligned}$$



۱۶. حداقل ضریب اصطکاک ایستایی بین چرخ های خودرو و سطح جاده چقدر باشد تا خودرو بتواند با تندی ۵۴ km/h پیچ افقی مسطحی را که شعاع آن ۵۰ m است، دور بزند؟


۴۴

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM



کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

ترازوی کاوندیش وسیله‌ای است که برای بررسی تجربی قانون جهانی گرانش نیوتون بکار می‌رود. نیوتون قانون گرانش خود بیان می‌کند که هر گاه دو ذره به جرم‌های m_1 , m_2 به فاصله r از یکدیگر قرار گیرند، این دو نیرو جاذبه‌ای بر یکدیگر وارد می‌کنند که این نیرو با حاصل ضرب اندازه دو جرم نسبت مستقیم و با مجدور فاصله بین آنها نسبت عکس دارد. اما این تناسب را می‌توان تعریف یک ثابت تنااسب در تساوی تبدیل نمود. این ثابت را ثابت جهانی گرانش می‌گویند. برای تعیین مقدار ثابت جهانی گرانش که ان را با G نمایش میدهیم، باید نیروی جاذبه میان دو جرم را اندازه گیری کنیم.



قسمتهای مختلف ترازوی کاوندیش

دو گلوله به جرم m

دو گلوله کوچک هر یک جرم m ، به دو انتهای یک میله سبکی متصل می‌شوند. این میله، دمبل صلبی است که محورش افقی است و توسط یک رشته نازک قائم آویزان شده است.

دو گلوله بزرگ به جرم M

دو گلوله بزرگ هر کدام به جرم M ، که در نزدیک دو سر دمبل و در دو طرف مخالف قرار داده شده‌اند. این دو گلوله نیز بر روی یک میله افقی قرار گرفته‌اند و نقطه وسط این میله بر روی تکیه گاهی قرار گرفته است، به گونه‌ای که می‌تواند آزادانه بچرخد. نقطه وسط این میله درست در راستای مرکز دمبل و در زیر آن قرار دارد.

آینه کوچک

این آینه کوچک بر روی رشته نازک و کمی بالاتر از دمبل قرار دارد. از طریق یک چشم‌هه نور، بر این آینه نور تابیده می‌شود، نور معکس شده از آینه بر روی یک مقیاس شیشه‌ای می‌افتد و به این وسیله میزان انحراف آینه (یا زاویه چرخش) آن قابل اندازه گیری است.

شرح کار ترازوی کاوندیش

هر گاه میله‌ای که دو جرم بزرگ m بر روی آن قرار گرفته‌اند، جرم‌های بزرگ M در نزدیکی جرم‌های کوچک m قرار گیرند، در این صورت بر اساس قانون جهانی گرانش نیوتون، بر گلوله‌های کوچک نیرو

۵-۲ نیروی گرانشی

فعالیت ۲-۵

ثابت گرانشی G را اولین بار هنری کاوندیش^۱ در سال ۱۷۹۸ اندازه گیری کرد. در مورد روش اندازه گیری G توسط هنری کاوندیش تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.



**کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM**

**کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM**

جادبهای وارد می شود، این امر باعث چرخیدن دمبل و در نتیجه تاب خوردن رشته نازک و چرخش آینه می شود. با استفاده از شیشه مدرج می توان میزان انحراف آینه (α) را هنگام چرخش گلوله های کوچک اندازه گیری نمود.

اندازه گیری G

ثابت G به کمک روش انحراف بیشینه تعیین می شود، همانطور که در طرز ترازو گفته شود میله بر اثر گرانش گلوله های بزرگ حول نقطه آویز می چرخد. در حین چرخش با گشتاور نیروها مخالفت می کند، α زاویه پیچش رشته هنگام حرکت گلوله ها از موضعی به موضع دیگر با مشاهده انحراف باریکه بازتابیده از آینه کوچک متصل به رشته اندازه گیری شود (تصویر رشته لامپ توسط آینه متصل به m و روی خط کش مدرج می افتد و در نتیجه هر گونه دوران m و m قابل اندازه گیری است).

اگر جرمها و فاصله میان آنها و نیز ثابت پیچش رشته معلوم باشد، می توانیم G را از روی زاویه پیچش اندازه گیری شده محاسبه کنیم. چون نیروی جاذبه کم است اگر بخواهیم پیچش قابل مشاهده ای داشته باشیم باید ثابت پیچش رشته فوق العاده کوچک باشد. در این ترازو جرمها مسلما ذره نبستند، بلکه اجسامی بزرگ هستند، اما چون این جرمها کره های یکنواختی هستند از لحاظ گرانشی طوری عمل می کنند که گویی تمام جرم آنها در مرکزشان متمرکز شده است. چون G بسیار کوچک است نیروهای گرانشی میان اجسام بر روی سطح زمین فوق العاده کوچک هستند و می توان از آنها صرفنظر کرد.

$$\left. \begin{array}{l} F = G \frac{M_e m}{r^2} \\ F = \frac{m V^r}{r} \end{array} \right\} \rightarrow r^r = \frac{GM_e T^r}{4\pi^r} \quad (\text{الف})$$

$$r^r = \frac{\left(6 / 67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2 / \text{kg}^2 \right) \left(5 / 98 \times 10^{24} \text{ kg} \right) \left(86400 \text{ s} \right)^2}{4 \times \left(3 / 14 \right)^r} \quad (\text{الف})$$

$$\rightarrow r = 42 / 26 \times 10^6 \text{ m} \quad (\text{ب})$$

$$v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{2 \times 3 / 14 \times 42 / 26 \times 10^6 \text{ m}}{86400 \text{ s}} = 3000 \text{ m/s}$$




در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو یاد بگیرید

@davaazdahom kelasema.com

**کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM**

تمرین ۱۱-۲

مدار هنگام با زمین^۱ و ماهواره های مخابراتی: از دیدگاه مخابراتی، باقی ماندن ماهواره در یک محل نسبت به مکانی در روی زمین (مثلًاً بالای ایران) انتیاز محسوب می شود. این در صورتی رخ می دهد که دوره گردش ماهواره به دور زمین با مدت زمان یک دور چرخش زمین به دور خودش، یعنی 24×60 دقیقه باشد.



(الف) در چه فاصله ای از زمین می توان این مدار هنگام با زمین را پاخت؟

(ب) تندی مداری این ماهواره چقدر است؟

۴۶

$$\left. \begin{array}{l} F = G \frac{M_e m}{r^3} \\ F = \frac{m V^3}{r} \end{array} \right\} \rightarrow G \frac{M_e m}{r^3} = \frac{m \left(\frac{4\pi r}{T} \right)^3}{r} \rightarrow G \frac{M_e}{r^3} = \frac{4\pi^3 r}{T^3} \rightarrow$$

$$T^3 = \left(\frac{4\pi^3}{GM_e} \right) r^3 \rightarrow T \propto r^{\frac{3}{2}}$$

پرسش ۱۱-۲
نشان دهد مریع دوره گردش ماهواره ها به دور زمین مناسب با مکعب فاصله ماهواره از مرکز زمین است.

۴۷

$$\left. \begin{array}{l} F = G \frac{M_e m}{r^3} \\ F = mg_h \end{array} \right\} \rightarrow G \frac{M_e m}{r^3} = mg_h \rightarrow g_h = G \frac{M_e}{(R_e + h)^3}$$

$$\rightarrow g_h = G \frac{M_e}{(R_e + h)^3} \xrightarrow{h=0} g_* = G \frac{GM_e}{R_e^3}$$

تمرين ۱۲-۲
نشان دهد شتاب گرانشی روی زمین برابر است با : $g = G \frac{M_e}{R_e^3}$

۴۸

$$\left. \begin{array}{l} F = G \frac{M_e m}{r^3} \\ F = \frac{m V^3}{r} \end{array} \right\} \rightarrow G \frac{M_e m}{r^3} = \frac{mv^3}{r} \rightarrow v^3 = G \frac{M_e}{r}$$

(الف)



$$\rightarrow (v^3 / s) = \frac{6 / 67 \times 10^{-11} Nm^3 / kg^3 \times 5 / 98 \times 10^14 kg}{r}$$

تمرين ۱۳-۲
تلسکوپ فضایی هابل با تندی $756^{\circ} m/s$ گرد زمین می چرخد.
الف) فاصله این تلسکوپ از سطح زمین چند کیلومتر است?
ب) وزن این تلسکوپ در این ارتفاع چند برابر وزن آن روی زمین است?
پ) دوره تناوب این تلسکوپ را پیدا کنید. ($R_e = 6380 km$)

۴۹

$$r = 6979000 m = 6979 km$$

$$\rightarrow h = r - R_e \rightarrow h = 6979 km - 6380 km = 599 km$$

$$\left(\frac{W_h}{W_{R_e}} \right) = \left(\frac{G \frac{M_e}{r^3}}{G \frac{M_e}{R_e^3}} \right) = \left(\frac{R_e}{r} \right)^3 \rightarrow \left(\frac{W_h}{W_{R_e}} \right) = \left(\frac{6380 km}{6979 km} \right)^3 = 0.8357$$

(ب)



$$T = \frac{2\pi r}{v} \rightarrow T = \frac{2 \times 3 / 14 \times 6979000 \text{ m}}{7560 \text{ m/s}} = 5797 / 37 \text{ s}$$



(پ)

$$F = G \frac{M_e m}{r^2} \rightarrow 10^{-8} N = \frac{6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2 \times 5.98 \times 10^{14} \text{ kg}}{(2m)^2} \rightarrow m = 1199 \text{ kg}$$

$$F = G \frac{M_e m}{r^2}$$

$$F = \frac{6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2 \times 5.98 \times 10^{14} \text{ kg}}{(2800 \times 10^3 \text{ m} + 6400 \times 10^3 \text{ m})^2}$$

$$F = 2827 / 5 \text{ N}$$



$$F = ma \rightarrow 2827 / 5 \text{ N} = 6.0 \text{ kg} \times a \rightarrow a = 471 \text{ m/s}^2$$

(پ)

$$a = \frac{v^2}{r} \rightarrow v = \sqrt{471 \text{ m/s}^2 \times 9200 \times 10^3 \text{ m}}$$


$$a = 6584 / 45 \text{ m/s}$$

$$T = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2 \times 3 / 14 \times 9200 \times 10^3 \text{ m}}{6584 / 45 \text{ m/s}} = 8774 / 61 \text{ s}$$

$$\frac{w_h}{w_{R_e}} = \left(\frac{R_e}{R_e + h} \right)^2 \rightarrow \frac{1}{2} = \left(\frac{R_e}{R_e + h} \right)^2$$

(الف)

$$\rightarrow \sqrt{2}R_e = R_e + h \rightarrow h = (\sqrt{2} - 1)R_e = 0.41R_e$$



پ. دو جسم در فاصله 2000 m از هم، یکدیگر را با نیروی گرانشی کوچک $N = 100 \times 10^4$ جذب می‌کنند. اگر جرم یکی از اجسام 50 kg باشد، جرم جسم دیگر چقدر است؟

پ1. ماهواره‌ای به جرم 60 kg در مداری دایره‌ای به ارتفاع 2800 کیلومتر از سطح زمین، به دور آن می‌چرخد.

(الف) نیروی گرانشی وارد بر ماهواره

(ب) شتاب ماهواره

(پ) تندی ماهواره

(ت) دوره تناوب ماهواره را در این ارتفاع بدست آورید.

$$(M_e = 5.98 \times 10^{14} \text{ kg}, R_e = 6400 \text{ km})$$



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو باد بگیرید

@davaazdahom kelasema.com

پ2. (الف) سر په ریسمی ریسمان ریسمان ورن یعنی سمس سمس چه نصف مقدار خود در سطح زمین می‌رسد؟

(ب) اگر جرم ماهواره‌ای 25 kg باشد، وزن آن در ارتفاع 3600 کیلومتری از سطح زمین چقدر خواهد شد؟

کanal تلگرام گام به گام کل دروس

@DAVAAZDAHOM

$$(b) F = G \frac{M_e m}{r^2}$$

$$F = \frac{6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2 \times 5.98 \times 10^{24} \text{ kg}}{(3.6 \times 10^6 \text{ m} + 6.4 \times 10^6 \text{ m})^2}$$

$$F = 55 / 467 \text{ N}$$

(الف)

$$g_{R_e} = \frac{GM_s}{R_e^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2 \times 1.99 \times 10^{24} \text{ kg}}{(1.496 \times 10^6 \text{ m})^2}$$

$$g_{R_e} = 5.93 \times 10^{-3} \text{ N/kg}$$

(ب)

$$g_{R_m} = \frac{GM_m}{R_m^2} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2 \times 7.36 \times 10^{22} \text{ kg}}{(3.84 \times 10^8 \text{ m})^2} = 3.33 \times 10^{-5} \text{ N/kg}$$



(الف)


$$F_{em} = G \frac{M_e m}{r^2} \quad \& \quad F_{mm} = G \frac{M_m m}{r^2}$$

$$F_{net} = G \frac{M_e m}{r^2} - G \frac{M_m m}{r^2} = \frac{Gm}{r} (M_e - M_m)$$

$$r_e = r_m = r = \frac{1}{2}d = \frac{1}{2} \times 3.84 \times 10^8 \text{ km} = 1.92 \times 10^8 \text{ m}$$

$$F_{net} = \frac{6.67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2 \times 3 \times 10^2 \text{ kg}}{(1.92 \times 10^8 \text{ m})^2} (5.98 \times 10^{24} \text{ kg} - 7.36 \times 10^{22} \text{ kg})$$

$$F_{net} = 320 / 59 \text{ N}$$



۵۲. (الف) شتاب گرانشی ناشی از خورشید در سطح زمین چقدر است؟

(ب) شتاب گرانشی ناشی از ماه در سطح زمین چقدر است؟

$$M_{\text{شمس}} = 1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$$

$$\text{فاصله زمین تا خورشید} = 1.496 \times 10^8 \text{ km}$$

$$\text{فاصله زمین تا ماه} = 3.84 \times 10^8 \text{ km}$$

۵۲

۵۳. (الف) سفینه ای به جرم $3.00 \times 10^7 \text{ kg}$ در وسط فاصله بین زمین و ماه قرار دارد. نیروی گرانشی خالصی را که از طرف زمین و ماه به این سفینه در این مکان وارد می شود بدست آورید (از داده های مسئله های قبل استفاده کنید).

(ب) در چه فاصله ای از زمین، نیروی گرانشی ماه و زمین بر سفینه، یکدیگر را خشتمی کنند؟

$$M_{\text{ماه}} = 7.36 \times 10^{22} \text{ kg}$$

$$\text{فاصله زمین تا خورشید} = 1.496 \times 10^8 \text{ km}$$

$$\text{فاصله زمین تا ماه} = 3.84 \times 10^8 \text{ km}$$

۵۴

(ب)

$$\left. \begin{aligned} F_{\text{net}} &= G \frac{M_e m}{r_e^r} - G \frac{M_m m}{r_m^r} \\ r_e + r_m &= d \end{aligned} \right\} \rightarrow = G \frac{M_e m}{r_e^r} - G \frac{M_m m}{r_m^r} \rightarrow \frac{M_e}{r_e^r} = \frac{M_m}{r_m^r}$$

$$\frac{M_e}{M_m} = \frac{r_e^r}{(d - r_e)^r} \rightarrow \frac{r_e^r}{(d - r_e)^r} = \sqrt{\frac{5 / 98 \times 10^{14} \text{ kg}}{7 / 36 \times 10^{14} \text{ kg}}} = 9$$

$$\rightarrow \frac{r_e^r}{d - r_e^r} = 9 \rightarrow r_e^r = 9d - 9r_e^r \rightarrow r_e^r = 9d / 10 = 3 / 456 \times 10^8 \text{ m}$$



کلاس ما



در کلاس درس کلاس ما عمیق مطالب رو باد بگیرید



@davaazdahom kelasema.com

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM

کanal تلگرام گام به گام کل دروس
@DAVAAZDAHOM